



LES AOÛTATS

Qu'est-ce qu'un Aoûtat ?

Les aoûtats, dont le nom scientifique est *Thrombicula autumnalis*, sont des acariens (de la même famille que les tiques), dont les larves apparaissent comme leur nom l'indique à la fin de l'été. On les appelle également aussi « vendangeurs » voire encore « lepte autumnal ». En Provence, le terme impropre d'arabis est parfois rencontré. Cette larve de 0,2 mm de long est à peine visible à l'oeil nu. Les trois stades (larve, nymphe et adulte) vivent dans les pelouses, les jardins potagers, les hautes herbes, etc. Seule la forme larvaire, pourvue de trois paires de pattes, nous intéresse pour nos compagnons. Ces larves ont besoin de se nourrir de lymphe ou de sang prélevés sur un animal à sang chaud, et peuvent donc aussi s'attaquer à l'homme ! Lors de la piqûre, l'aoûtat injecte une substance lui permettant de « digérer » les tissus, et c'est cette injection qui va provoquer une démangeaison extrêmement intense pour votre animal. Autrefois relativement saisonnier, le phénomène des aoûtats peut maintenant perdurer jusqu'à la fin de l'hiver, même en cas de gelées.

Comment repérer les aoûtats ?

Du fait de leur très petite taille, ils sont très difficiles à repérer sans un examen minutieux. On les trouve plus facilement aux endroits où la peau est fine : entre les doigts, sur les cuisses, autour de l'aire génitale, sous les aisselles, autour des mamelons et également dans le repli externe du bord de l'oreille appelé « oreillon ». De couleur orangé plus ou moins foncé, ils se réunissent parfois en chapelets. Le chien ou le chat est alors pris de démangeaisons et de léchages parfois frénétiques, démangeaisons pouvant conduire à des plaies de grattage importantes. Un léchage intense au niveau des espaces interdigités est un signe qui doit faire rechercher la présence de ce parasite.

Comment traiter les aoûtats et limiter le prurit ?

La plupart des antiparasitaires proposés chez votre vétérinaire ont une action contre les aoûtats. Toutefois, la localisation préférentielle des larves amène le plus souvent à préférer la forme spray. Chez les animaux pour qui les sprays sont d'utilisation délicate, on peut utiliser un gant en latex sur lequel on pulvérisera l'antiparasitaire afin d'appliquer le produit directement sur les parties concernées. L'utilisation d'un coton-tige imbibé du produit pourra dans certains cas faciliter l'accès à des zones difficiles d'accès. Il faudra veiller à ce que le produit antiparasitaire soit bien mis sur la peau et pas seulement sur le pelage. Pour éviter que votre animal se lèche juste après l'avoir traité, il est recommandé d'appliquer le traitement juste avant une promenade, un moment de jeu ou avant le repas. Ainsi, l'animal sera occupé à autre chose pendant que le produit agira.

Un traitement médical anti-inflammatoire peut-être mis en place provisoirement en cas de fort prurit pour limiter les lésions

Conclusion :

Les aoûtats sont des parasites qui ne sont pas dangereux. En revanche, leurs piqûres douloureuses entraînent des démangeaisons qui peuvent devenir problématiques. Une bonne prévention et une observation attentive de votre part, lors d'un retour de promenade, permettront de traiter le problème tout de suite.

